

CALENDÁRIO VACINAL SBIm 2021/2022

Do nascimento à terceira idade






VACINAS COVID-19 – Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19

Elaborado por


Sociedade Brasileira de Imunizações

Um oferecimento



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																				ADOLESCENTE		ADULTO	IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS					
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	11 a 19 anos	20 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*					
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente														Vacinar pessoas contactantes de hanseníase						SIM		SIM		NÃO				
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente													SIM		SIM		SIM					
Rotavírus			Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.					CONTRAINDICADA															SIM		SIM		NÃO			
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)			Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO			Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa			Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)					SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde		SIM, DTPa e dTpa		SIM, DTPa			
Haemophilus influenzae tipo b				Três doses iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO		Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses		SIM		SIM			
Poliomielite (vírus inativados)			Três doses iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO			REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses		SIM		SIM			
Pneumocócicas conjugadas			Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade							REFORÇO		VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente			VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco					VPC13: uma dose		SIM, VPC10, menores de 5 anos		SIM		SIM, VPC10 e VPC13				
Meningocócicas conjugadas				Duas doses iniciando aos 3 meses de idade						REFORÇO				REFORÇO			REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos		Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 12 anos		SIM		SIM, menC e menACWY				
Meningocócica B					Duas doses iniciando aos 3 meses de idade						REFORÇO		Para os não vacinados anteriormente – De 12 a 23 meses e 29 dias: três doses De 24 meses a 19 anos: duas doses						Vacinar pessoas em situações especiais de risco			NÃO		SIM		NÃO				
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)											CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO												SIM		NÃO		NÃO			
Influenza (gripe)							VACINAÇÃO ANUAL															SIM, menores de 6 anos e maiores de 60 anos		SIM		SIM				
Febre amarela										Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias, dose única. Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal													SIM		SIM		NÃO			
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)											Duas doses a partir dos 12 meses			Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, até 59 anos		SIM		NÃO					
Varicela (catapora)											Duas doses a partir dos 12 meses			Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente							SIM		SIM		SIM					
Hepatite A											Duas doses a partir dos 12 meses			Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos		SIM		SIM					
HPV																		Duas doses para meninas e meninos	Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.		Vacinar os não vacinados anteriormente, a critério médico (três doses)				SIM, duas doses. Meninas (9 a 14 anos) e meninos (11 a 14 anos)		SIM		SIM	
Pneumocócica 23 valente													Vacinar pessoas em situações especiais de risco							Duas doses com intervalo de cinco anos		NÃO		SIM		SIM				
Herpes zóster																				De 50 a 59 anos: a critério médico		Uma dose		NÃO		SIM		NÃO		
Dengue		CONTRAINDICADA																	Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses			CONTRAINDICADA		NÃO		SIM		NÃO		
VACINAS	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	11 a 19 anos	20 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*					
DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																				ADOLESCENTE		ADULTO	IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS						